

জাত পরিচিতি

বিআর৯ বোরো ও আউশ উভয় মৌসুমের জাত। এর জনপ্রিয় নাম সুফলা। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট ১৯৭৮ সালে এ জাত উদ্ভাবন করেছে।



বিআর৯

জাতের বৈশিষ্ট্য

- উচ্চতা ১২৫ সেন্টিমিটার।
- চাল লম্বা, মাঝারি মোটা ও সাদা।
- শিলাবৃষ্টি এলাকার জন্য উপযোগী।

জীবনকাল

এর জীবনকাল ১৫৫ দিন (বোরো) এবং ১২০ দিন (আউশ)

ফলন

ফলন হেক্টের প্রতি ৬.০ টন (বোরো) এবং ৫.০ টন (আউশ)

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. বীজতলায় বীজ বপনঃ বোরো মৌসুমে ২০ কার্টিক- ৫ অগ্রহায়ণ (৪-১৯ নভেম্বর) এবং রোপা আউশে ১৫- ৩০ চৈত্র (২৯ মার্চ-১৩ এপ্রিল)।

২. চারার বয়সঃ বোরো মৌসুমে ৪০-৪৫ দিন এবং আউশে ২০-৩০ দিন।

৩. রোপণ দূরত্বঃ বোরো মৌসুমে ২৫×১৫ সেন্টিমিটার এবং আউশে ২০×১৫ সেন্টিমিটার।

৪. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):

৪.১	ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিংক (বোরো মৌসুমে)
	৪০	১৩	২২	১৫	১৫
৪.২	ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিংক (আউশ মৌসুমে)
	১৮	৭	১১	০	০

৪.৩ ইউরিয়া সার সমান ৩ কিণ্টিতে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, রোপণের ২০-২৫ এবং ৬০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া প্রয়োগ করা উত্তম।

৫. আগাছা দমনঃ রোপনের পর অন্তত ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৬. সেচ ব্যবস্থাপনাঃ ধানের চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

৭. রোগ বালাই দমনঃ অনুমোদিত বালাই দমন ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে।

৮. ফসল পাকা ও কাটাঃ বোরো মৌসুমে ১-১৫ বৈশাখ (১৪-২৮ এপ্রিল) এবং রোপা আউশে ২০ শ্রাবণ-৫ ভদ্র (৪ আগস্ট-২০ আগস্ট)

আরো তথ্যের জন্য :

পরিচালক (গবেষণা), বি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd