

জাত পারাচাটি

ত্রি ধান৬৬ কৌলিক সারি IR82636-B-B-75-21 উক্ত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনসিটিউট, ফিলিপিনে IR8875-176-B-2 এবং IR78875-207-B-3 নামক Genotype এর সংকরায়ন করে বংশানুক্রম সিলেকশান (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ২০১০ সালে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট কর্তৃক উক্ত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনসিটিউট হতে Introduction করে খরা প্রবণ এলাকায় বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। পরবর্তীতে ২০১২ এবং ২০১৩ সালে কৌলিক সারিটি বাংলাদেশের বিভিন্ন খরাপ্রবণ এলাকায় ক্ষেত্রের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় রোপা আমন মৌসুমে জাত হিসাবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। এ জাতটি ২০১৪ সালে জাতীয় বীজবোর্ড কর্তৃক ক্ষেত্রে পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে।



ত্রি ধান৬৬

জাতের বৈশিষ্ট্য

- ▶ উচ্চ ফলনশীল।
- ▶ গাছের উচ্চতা ১১৮-১২০ সেমি।
- ▶ ডিগপাতা খাড়া, প্রশস্ত এবং লম্বা।
- ▶ ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪ গ্রাম।
- ▶ চাল মাঝারি লম্বা ও মোটা।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ত্রি ধান৬৬ এর জীবনকাল ত্রি ধান ৫৬ এর চেয়ে ৩-৪ দিন বেশী। ত্রি ধান৬৬ একটি খরা সহনশীল জাত। প্রজনন পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১৫-২০ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন ক্ষতি হয় না। সে সময় Parch Water table Depth ভূপৃষ্ঠ (Surface) থেকে ৭০-৮০ সেমি নিচে থাকলে এবং মাটির আর্দ্রতা ২০% এর সীচে হলেও এ জাতটি ভাল ফলন দিতে সক্ষম।

জীবনকাল

জাতটির জীবনকাল ১১০-১১৫ দিন।

ফলন

উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে বিআর৬৬ এর ফলন ৪.৫ টন থেকে ৫.০ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়। তবে প্রজনন পর্যায়ে বৃষ্টির অভাবে ১৫-২০ দিন খরা পড়লে হেস্টেরে ৪.০-৪.৫ টন ফলন পাওয়া যায়।

চাষাবাদ পদ্ধতি

জাতটি বৃষ্টি নির্ভর রোপা আমন মৌসুমের জন্য উপযোগী। চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উক্ষী রোপা আমন ধানের মতই।

১. বীজতলায় বীজ বপনঃ ১৫ আশাঢ় থেকে ৩০ আশাঢ় (২৯ জুন-১৪ জুলাই)।

২. চারার ব্যবস্থাঃ ২০-২৫ দিন।

৩. চারার সংখ্যাঃ প্রতি গুছিতে ২/৩ টি।

৪. রোপণ দূরত্বঃ ৪-৫ সেমি X ১৫ সেমি।

৫. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):

৫.১ ইউরিয়া টিএসপি এমওপি জিপসাম জিংক সালফেট

২৪ ১০ ১০ ৮ ১

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সব্যটুকু টিএসপি, এমওপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট একসাথে প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান তিনি কিস্তিতে যথা জমি তৈরীর শেষ পর্যায়ে ১ম কিস্তি রোপনের ২৫-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৩৫-৪০ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

৬. আগাছা দমনঃ ৪ রোপনের পর অন্তত ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৭. সেচ ব্যবস্থাপনাঃ চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

৮. রোগবালাই দমনঃ ত্রি ধান৬৬ জাতে রোগবালাই ও পোকার আক্রমন প্রচলিত অন্যান্য জাতের চেয়ে অনেক কম। তবে রোগবালাই ও পোকার আক্রমন দেখা দিলে বালাইনাশক প্রয়োগ করা উচিত।

৯. ফসল পাকা ও কাটাঃ ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ১০-২৫ কার্টিক (২৫ অক্টোবর-১০ নভেম্বর)।

আরো তথ্যের জন্যঃ

পরিচালক (গবেষণা), ত্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd