

গবাদি প্রাণির টিকার সময়সূচী

রোগের নাম	টিকার নাম	টিকা প্রদানের বয়স/সময়			মাত্রা	প্রয়োগের স্থান
		প্রাথমিক	বুস্টার	পুনঃ টিকা প্রদান		
বাদলা	বাদলা টিকা	৪ মাস	--	৬ মাস	গরু/মহিষ- ৫মিলি ভেড়া/ছাগল- ২মিলি	চামড়ার নিচে
তড়কা	তড়কা টিকা	৬ মাস	--	১ বৎসর	গরু /মহিষ- ১মিলি ভেড়া/ছাগল- ০.৫মিলি	চামড়ার নিচে
গলাফুলা	গলাফুলা টিকা (অয়েল এ্যাডজুভেন্ট)	৬ মাস	২-৪ সপ্তাহ	৬ মাস	গরু /মহিষ- ২ মিলি ভেড়া/ছাগল- ১ মিলি	চামড়ার নিচে
গলাফুলা	গলাফুলা টিকা (এ্যালাম অধঃপতিত)	৬ মাস	২-৪ সপ্তাহ	৬ মাস	গরু /মহিষ- ৫ মিলি ভেড়া/ছাগল- ২ মিলি	মাংসে
ক্ষুরা রোগ	এফএমডি টিকা (বাইভ্যালেন্ট/ ট্রাইভ্যালেন্ট)	৬ মাস	২১ দিন	৪ মাস	গরু /মহিষ- ৬মিলি ভেড়া/ছাগল- ২মিলি	চামড়ার নিচে
জলাতরু	জলাতরু টিকা (HEP)	গরু/মহিষ/-৩ মাস বিড়াল/বেজী-১ মাস কুকুর- ২ মাস	--	১ বৎসর	গরু /মহিষ/বানর - ৩মিলি বিড়াল/বেজী- ১.৫মিলি কুকুর- ৩ মিলি (বিঃ দ্রঃ মায়ের টিকা দেয়া না থাকলে)	মাংসে
জলাতরু	জলাতরু টিকা (LEP)	৪ মাস	--	১ বৎসর	কুকুর- ৩ মিলি (বিঃ দ্রঃ মায়ের টিকা দেয়া থাকলে)	মাংসে
ধনুষ্ঠংকার	ধনুষ্ঠংকার টিকা	৩-৪ মাস	৪-৬ মাস	১ বৎসর	ভেড়া/ছাগল- ০.৫ মিলি	মাংসে / চামড়ার নিচে
পিপিআর	পিপিআর টিকা	২ মাস	৬ মাস	১ বৎসর	ভেড়া/ছাগল- ১ মিলি	চামড়ার নিচে
ছাগলের বসন্দু	ছাগলের বসন্দু টিকা	২ মাস	--	১ বৎসর	ছাগল- ১ মিলি	চামড়ার নিচে

[বি. দ্র.- টিকা প্রদানের পূর্বে টিকার মোড়কের নির্দেশনা ভালোভাবে পড়ে নিতে হবে।]

হাঁস-মুরগির টিকার সময়সূচী

রোগের নাম	টিকার নাম	টিকা প্রদানের বয়স/সময়			মাত্রা	প্রয়োগের স্থান
		প্রাথমিক	বুস্টার	পুনঃ টিকা প্রদান		
মারেন্স ডিজিজ	মারেন্স টিকা	১ দিন	--	--	০.২ মিলি	চামড়ার নীচে
বাচ্চা মুরগির রাণীক্ষেত	বিসিআরডিডি	৪-৭ দিন	২১ দিন	--	১ ফোটা	চোখে
মুরগির রাণীক্ষেত	আরডিডি	২ মাস	--	৬ মাস	১ মিলি	মাংসে
ফাউল পক্স	ফাউল পক্স টিকা	২১ দিন	১০ দিন	--	পরিমাণ মত	ডানার জালিকা সূচ দিয়ে খুঁচিয়ে
পিজিয়ন পক্স	পিজিয়ন পক্স টিকা	৩-৭ দিন	১০ দিন	--	পরিমাণ মত	ডানার জালিকা সূচ দিয়ে খুঁচিয়ে
ফাউল কলেরা	ফাউল কলেরা টিকা (অয়েল এ্যাডজুভেন্ট)	২ মাস	১৫ দিন	৬ মাস	১ মিলি	চামড়ার নীচে
ফাউল কলেরা	ফাউল কলেরা টিকা (এ্যালাম অধঃপতিত)	২ মাস	১৫ দিন	৬ মাস	১ মিলি	মাংসে
ফাউল টাইফয়েড/ সালমোনেলোসিস	ফাউল টাইফয়েড/ সালমোনেলোসিস টিকা	৬ সপ্তাহ- ১ম ডোজ ৩০ দিন পর- ২য় ডোজ	৬ মাস	--	০.৫ মিলি	গলার চামড়ার নীচে
গামবোরো	গামবোরো টিকা	১২-১৯ দিন	৭ দিন	--	১ ফোটা	চোখে
ডাকপেপ্টিং	ডাকপেপ্টিং টিকা	৩ সপ্তাহ	৬ মাস	৬ মাস	১ মিলি	বুকের মাংসে

[বি. দ্র.- টিকা প্রদানের পূর্বে টিকার মোড়কের নির্দেশনা ভালোভাবে পড়ে নিতে হবে।]

টিকা ব্যবহারের সাধারণ নিয়মাবলী

- ১। প্রতিষেধক টিকা সবসময়ই সুস্থ পশু-পাখিতে প্রয়োগ করতে হয়।
- ২। সংক্রামক রোগ বা কৃমিতে আক্রান্ত পশু-পাখিকে টিকা দেয়া উচিত নয়। তাতে কাজিত মাত্রায় রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয় না।
- ৩। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া গর্ভবতী পশুকে টিকা দেওয়া উচিত নয়।
- ৪। টিকা বীজ কোন অবস্থাতেই সূর্যের আলোতে আনা ঠিক নয়।
- ৫। ব্যবহারের মিশ্রণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পাত্র, সিরিঞ্জ-নিডল, ডাইলিউশনের জন্য ব্যবহৃত তরল পদার্থ, টিকা ব্যবহারকারীর হাত ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত হওয়া প্রয়োজন।
- ৬। জীবাণুমুক্ত করণের জন্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা উচিত নয়।
- ৭। প্রতিষেধক টিকা সকালে বা সন্ধ্যার সময় প্রয়োগ করা উত্তম।
- ৮। ব্যবহারের জন্য গোলানোর পর যত দ্রুত সম্ভব টিকা ব্যবহার করে ফেলা উচিত। গোলানোর ১ ঘন্টা পর কিংবা পরবর্তীতে অব্যবহৃত টিকা আর ব্যবহার করা যায় না।
- ৯। মেয়াদ উত্তীর্ণ বা টিকার সাধারণ রং পরিবর্তন হয়ে গেলে সে টিকা আর ব্যবহার করা যাবে না।
- ১০। টিকা পরিবহনের ক্ষেত্রে কুল চেইন বা ঠান্ডা অবস্থায় পরিবহন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- ১১। তাপ প্রতিরোধের কুল-ভ্যান/কন্টেইনার/ফ্লাস্কের মধ্যে বরফ দিয়ে টিকা পরিবহন করতে হয়।
- ১২। ব্যবহারের সময় টিকা মিশ্রণের পাত্র ছায়াযুক্ত স্থানে বরফ দেওয়া বড় পাত্রে মধ্যে রাখা উচিত।
- ১৩। ভাইরাস জনিত রোগ প্রতিরোধক টিকা প্রয়োগকালে টিকা প্রয়োগস্থান পরিত্রুত পানি দ্বারা পরিষ্কার করে নিতে হবে এবং এই জন্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা যাবে না।

টিকা সংরক্ষণের সাধারণ নিয়মাবলী

টিকার নাম	সংরক্ষণ পদ্ধতি	সংরক্ষণের মেয়াদ
১। স্কুরা রোগ	৪° থেকে ৮° সেঃ	৩-৬ মাস
২। তড়কা	৪° থেকে ৮° সেঃ	৬ মাস
৩। বাদলা	৪° থেকে ৮° সেঃ	৬ মাস
৪। গলাফুল্লা	৪° থেকে ৮° সেঃ	৬ মাস
৫। জলাতংক	-২০° সেঃ	১ বছর
	০° সেঃ	৪৮ ঘন্টা
৬। ছাগলের পিপিআর	-২০° সেঃ	১ বছর
	-৫° থেকে ০° সেঃ	৬ মাস
	২° থেকে ৮° সেঃ	১ মাস
৭। ছাগলের বসন্ত	-২০° সেঃ	১ বছর
	২° থেকে ৮° সেঃ	১ মাস
৮। মারেন্স	-২০° সেঃ	১ বছর
	-৫° থেকে ০° সেঃ	৬ মাস
৯। বাচ্চা মুরগির রাণীক্ষেত	-২০° সেঃ	১ বছর+
	-৫° থেকে ০° সেঃ	৬ মাস
	৪° থেকে ৯° সেঃ	৪ মাস
	থার্মোস্টেবল বরফ সহ	১৫ দিন
১০। বড় মুরগির রাণীক্ষেত	-২০° সেঃ	১ বছর+
	-৫° থেকে ০° সেঃ	৬ মাস
	৪° থেকে ৯° সেঃ	৪ মাস
	থার্মোস্টেবল বরফ সহ	১৫ দিন
১১। ফাউল পল্ল	-২০° সেঃ	১ বছর
	-৫° থেকে ০° সেঃ	৫ মাস
১২। পিজিয়ন পল্ল	-২০° সেঃ	১ বছর
	-৫° থেকে ০° সেঃ	৫ মাস
১৩। হাঁস-মুরগির কলেরা	৪° থেকে ৮° সেঃ	৬ মাস
১৪। সালমোনেলসিস/ফাউল টাইফয়েড	২° থেকে ৮° সেঃ	৬ মাস
১৫। গামবোরো	০° সেঃ	৬ মাস
১৬। ডাকপেটগ	-৫° থেকে ০° সেঃ	৬ মাস
	৪° থেকে ৮° সেঃ	১ মাস
	থার্মোস্টেবল বরফ সহ	৭ দিন

(ডাঃ অভিমান্য চন্দ্র)

উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার

মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ।